



**Cultivos sanos,
orgánicos y 100%
productivos**

Producido y distribuido por:



**Líderes en
precio y calidad**
Producto garantizado
Agricultura BIO

Supelano Prada & cia es una empresa de matriz familiar creada en el 2003 con el objetivo de producir Micorriza para una agricultura sostenible.

En **SUPPRA COLOMBIA** producimos y comercializamos biofertilizantes (Micorriza Mycorrizz) y productos a base de microorganismos benéficos del suelo, en especial bacterias y/o hongos que viven asociados o en simbiosis con las plantas y ayudan de manera natural a su nutrición y crecimiento, además de ser mejoradores del suelo.



**Más de 17 años
de experiencia
en agrotecnología**

Nuestro Producto

¿QUÉ ES?


MICO: HONGO RHYZA: RAÍZ

Micorriza Mycorrizz® son microorganismos (hongos) benéficos que forman un intercambio significativo con la raíz de la planta; este producto facilita la captación de minerales, especialmente fósforo, zinc y cobre y aumenta la resistencia al pH adverso del suelo.

“Nuestro producto no se mide por la cantidad de esporas, sino por su calidad. Tenemos cepas 100% nativas colombianas para ver resultados inmediatos en cualquier tipo de suelo.”


El 90% de nuestras esporas colonizan la raíz de la planta, lo suficiente para ver resultados inmediatos.

Micorrizas Mycorrizz®
Para todo tipo de cultivo,
pasto y follaje



17 años de investigación

14 géneros de esporas



Acaulospora Mellea

A. delicata-like, A. geosporum
A. geosporum-like, A. bireticulata-like
A. morrowiae, A. scrobiculata
A. miniscrobiculata, A. rehmsii
A. spinosa, Acaulospora sp




Glomus Aggregatum

G. clarum, G. fuegianum c.f.
G. greenish, G. ice, G. rubiformis
Glomus spp, Paraglomus occultum



Entrophospora Colombiana



Gigaspora sp.

***Algunos de nuestros géneros de esporas**
N° de propágulos: 35.000 - 45.000 esporas por Kg de suelo.

Presentaciones de nuestros producto



Bulto de 40 y 25 Kg



5 Kg



1 Kg

El uso de **Micorrizas Mycorrizz®** permite optimizar el desarrollo radicular de los cultivos hasta en un 200%, permitiéndole a la planta asimilar de una manera más eficiente los nutrientes esenciales para su desarrollo, sin necesidad de utilizar fertilizantes químicos. La aplicación de **Micorrizas Mycorrizz®** es 100% orgánica, permitiendo que la planta tenga beneficios como resistencia al estrés hídrico, protección contra patógenos radiculares, mejor absorción de nutrientes, entre otros.

¿Por qué usar Micorrizas Mycorrizz?

- Mejor anclaje
- Estimulación en la floración
- Mayor actividad microbiana
- Aumento en el desarrollo foliar
- Mayor absorción de nutrientes y agua
- Regenerados de la capa vegetal del suelo
- Mayor estimulación en el crecimiento, la raíz crece hasta en un 200%
- Potencializador de la fertilización, ahorra entre el 30% y 50% en fertilización

- Posición arancelaria
- Conocimiento de origen
- Certificado Antinarcótico
- Registro ICA de producción de MICORRIZAS
- Registro de venta de MYCORRIZZ
- Registro de departamento técnico de ensayos de eficacia de bioingeniería
- Registro Orgánico Internacional OMRI

Seguimiento y Récord de aplicación



PRE-VIVERO

Aplicar Mycorrizz® en contacto directo con la semilla.



SEMILLERO

Aplicar Mycorrizz® incorporado con el sustrato definido para su cultivo.



VIVERO

Aplicar Mycorrizz® en contacto directo con la raíz.



ALMÁCIGO

Aplicar Mycorrizz® de la misma manera que el vivero.



TRASPLANTE O SIEMBRA

Aplicar Mycorrizz® siempre al fondo del hoyo antes de colocar la plántula.



POS SIEMBRA


Perforar cuatro hoyos en forma de "x" a 15 cm del tallo y a 20 cm de profundidad, para tener contacto directo con la raíz.

Orden de aplicación

1. Hoyo según el cultivo
2. Abono orgánico
3. Aplicación de micorriza Mycorrizz

4. Planta

5. Desarrollo radicular



Dosificación y Aplicación

Cultivos permanentes

Planta	Época de aplicación			
	Pre - vivero	Vivero	Trasplante o siembra	Pos - siembra
Palma de Aceite	30 gr/planta	60 gr/planta	150 gr/planta	150 gr/planta
Pastos de corte	0 gr/planta	30 gr/planta	70 gr/planta	A un año 5 gr/planta ó 350 kg/Ha.
Plátano y Banano	No aplica	100 gr/hiijo	100 gr/planta	100 gr/planta
Pasto de Pastoreo	0 gr/planta	0 gr/planta	500 kg/Ha. Incorporado con la semilla	A un año 400 kg/Ha.
Caña Panelera	0 gr/planta	0 gr/planta	30 gr/semilla (esqueje)	No aplica
Planta	Germinador	Almácigo	Trasplante o siembra	Pos-siembra
Café	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	100 gr/planta
Planta	Germinador	Vivero	Trasplante o siembra	Pos-siembra
Cacao	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	100 gr/planta
Caucho	30 gr/planta	E injerto en bolsa 50 gr/planta	150 gr/planta	100 gr/planta

Hortalizas

	Época de aplicación		
		Vivero	Trasplante o siembra
Haba	No aplica	No aplica	30 gr/planta
Habichuela	No aplica	No aplica	30 gr/planta
Frijo'	No aplica	No aplica	30 gr/planta
Arveja	No aplica	No aplica	30 gr/planta
Tomate	No aplica	No aplica	30 gr/planta
Pimentón	No aplica	No aplica	30 gr/planta
Zanahoria	No aplica	No aplica	40 gr/planta
Berenjena	No aplica	No aplica	30 gr/planta
Remolacha	No aplica	No aplica	30 gr/planta
Cebolla junca	No aplica	No aplica	150 kg/Ha ó 20 gr/semilla
Ajo	No aplica	No aplica	150 kg/Ha ó 20 gr/semilla
Cebolla cabeza	No aplica	No aplica	30 gr/sitio
Planta	Semiller o	Vivero	Trasplante o siembra
Acelga	1 kg/m ²	No aplica	30 gr/planta
Lechuga	1 kg/m ²	No aplica	30 gr/planta

*Los porcentajes reflejados en la tabla corresponden a la dosis mínima de aplicación. Para obtener mayores resultados duplique la dosis y repártala en las etapas de siembra. En tubérculos debe respetarse la dosis de la tabla.

Cultivos transitorios

Planta	Época de aplicación			
	Pre- vivero	Vivero	Trasplante o siembra	Pos - siembra
Maíz y sorgo	No aplica	No aplica	10 gr/semilla	No aplica
Arroz	No aplica	No aplica	320 kg/Ha. Al boleó incorporado al suelo al momento de la siembra con la semilla	No aplica
Girasol para aceite	0 gr/planta	0 gr/planta	20 gr/planta	No aplica
Girasol para flor	0 gr/planta	0 gr/planta	30 gr/planta	No aplica
Papa	No aplica	No aplica	500 kg/Ha	No aplica
Planta	Semillero	Almácigo	Trasplante o siembra	Pos-siembra
Tabaco	0 gr/planta	10 gr/planta	30 gr/planta	No aplica

Cultivos Frutales

Planta	Época de aplicación			
	Pre-vivero	Vivero	Trasplante o siembra	Pos - siembra
Cítricos	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Mango	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Aguacate	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Mora	No aplica	No aplica	80 gr/planta	120 gr/planta
Fresa	No aplica	No aplica	30 gr/planta	50 gr/planta
Uva	No aplica	30 gr/planta	100 gr/planta	120 gr/planta
Piña	No aplica	No aplica	30 gr/planta	No aplica
Manzano	No aplica	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Durazno	No aplica	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Pera	No aplica	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Melón	No aplica	30 gr/planta	30 gr/planta	No aplica
Sandía	No aplica	No aplica	30 gr/planta	No aplica
Guanábana	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Breva	0 gr/planta	30 gr/planta	70 gr/planta	240 gr/planta
Tomate de árbol	0 gr/planta	30 gr/planta	70 gr/planta	240 gr/planta
Granadilla	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Maracuyá	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Curuba	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Papaya	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Ciruelo	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	240 gr/planta
Planta	Semillero	Vivero	Trasplante o siembra	Pos-siembra
Uchuva	0 gr/planta	30 gr/planta	80 gr/planta	80 gr/planta

*Los porcentajes reflejados en la tabla corresponden a la dosis mínima de aplicación. Para obtener mayores resultados duplique la dosis y repártala en las etapas de siembra. En tubérculos debe respetarse la dosis de la tabla.

Cultivo ornamentales

Planta	Época de aplicación			
	Pre-vivero	Vivero	Trasplante o siembra	Pos-siembra
Rosa	Patrones, Plantines ó Plantas 10 gr/planta			20 gr/planta
Lilium	0 gr/planta	0 gr/planta	10 gr/planta	A un año 20 gr/planta
Gypsophyla	0 gr/planta	0 gr/planta	20 gr/planta	A un año 40 gr/planta
Pompón	0 gr/planta	0 gr/planta	20 gr/sitio	A un año 40 gr/planta
Flores de verano en general	0 gr/planta	0 gr/planta	20 gr/sitio	A un año 40 gr/planta
Flores tropicales	0 gr/planta	0 gr/planta	100 gr/planta	A un año 200 gr/planta

Aromáticas y Medicinales

Planta	Época de aplicación			
	Pre-vivero	Vivero	Trasplante o siembra	Post-siembra
Todas en general Porte alto	0 gr/planta	0 gr/planta	30 gr/planta	60 gr/planta
Todas en general Porte medio	0 gr/planta	0 gr/planta	20 gr/planta	40 gr/planta
Todas en general Porte bajo	0 gr/planta	0 gr/planta	10 gr/planta	20 gr/planta

Cultiv variosos

Planta	Época de aplicación			
	Pre-vivero	Vivero	Trasplante o siembra	Pos-siembra
Trigo	No aplica	No aplica	350 kg/Ha incorporado al suelo al momento de la siembra con la semilla	No aplica
Cebada	No aplica	No aplica		No aplica
Yuca	No aplica	No aplica	50 gr/planta	No aplica
Ñame	No aplica	No aplica	70 gr/planta	No aplica
Zapallo	No aplica	No aplica	80 gr/planta	No aplica
Cocotero	No aplica	0 gr/planta	100 gr/planta	No aplica
Planta	Semiller o	Vivero	Trasplante o siembra	Pos-siembra
Maderables o forestales	0 gr/planta	30 gr/planta	100 gr/planta	A un año 150 gr/planta

*Los porcentajes reflejados en la tabla corresponden a la dosis mínima de aplicación. Para obtener mayores resultados duplique la dosis y repártala en las etapas de siembra. En tubérculos debe respetarse la dosis de la tabla.

Abra la cámara de su celular y póngala sobre este cuadro, luego de clic en la pestaña que se despliega para ver uno de nuestros **casos de éxito.**




Contacto

Carrera 18 # 21 - 35

Bucaramanga, Santander, Colombia

Teléfono: (7) 6522017 - Celular: 3163001065

ventas@suppracolombia.com



www.suppracolombia.com